


Вы наблюдаете 58-летнюю пациентку, которой 2 года назад был поставлен диагноз рака яичника IV стадии. Она находится дома, получает оральный морфин, у нее непроходимость кишечника, обезвоживание и кахексия. Родственники говорят, что в течение суток она отказывается от еды и не пьет, и просят назначить внутривенное введение жидкости, т.к. боятся, что она страдает от жажды. При посещении, вы видите исхудавшую женщину, дыхание тяжелое, прерывистое, на вопросы реагирует вяло, глаза приоткрыты, губы сухие..

2

?

?


- Помощь в конце жизни, имеющая ограниченные временные рамки – последние 48 -72 часа жизни




3

- , ,
-
-
-

4




Field & Cassel, 1997




Field & Cassel, 1997



Field & Cassel, 1997



Lunney et al., 2003



10

11

12

- Страхи:
 - «не выдержит»,
 - голодная смерть

- В реальности:**
- пища может вызывать тошноту
 - анорексия может выполнять защитную функцию
 - риск аспирации
 - сжатые зубы выражают желания, контроль

13

- Страхи:
 - обезвоживание
 - жажда

- **В реальности:**
 - обезвоживание не вызывает страданий
 - обезвоживание может служить защитой

Парентеральное введение жидкости может причинить вред (избыток жидкости, удушье, кашель, секрет)

14

- ,
- ...
- Очень тяжело для родных и близких
 - Осознание окружения > способности ответить
 - Нужно помнить, что больной все слышит

- ,
- ...
- Создание знакомой окружающей обстановки
 - Включение в беседу
 - Присутствие, безопасность
 - Разрешение умереть
 - Важность прикосновения

15

16

- 1-2

, 2-10

- 1-5

- 1-5

0,5-1

– 0,5-2,0

/ ,

– 10-20
6

66

۶۹

6

99

– 0,2-0,4
1-10

- 0,2

4

1

4-6

1



21

22

4-6


23

24



25

26



27

28

•

•

29

30

1		%	1	
1		26%	9-14	()
2		15%	10-11	
3		72%	15-22	
4		20%	6-8	
5	,	36%	12-22	
6		20%	3-6	
7		23%	7	
8	,	26%	5-12	
9		25%	6-11	
10		25%	9-14	
11		59%	10-36	
12		27%	5-6	31
13		25%	9-12	

